

Standort/ Adressen

Institut für Internationale Gesundheit

Campus Virchow-Klinikum
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Tel: +49 (0)30-450 565 700
Fax: +49 (0)30-450 565 989
E-mail: tropeninstitut@charite.de
<https://internationale-gesundheit.charite.de>
Direktorin: Prof. Dr. med. Beate Kampmann

Alle Leistungen für Kassen- und Privatpatienten!

Reisemedizinische Beratung und Impfungen

Campus Virchow-Klinikum,
interne Geländeadressen:
Mo - Fr: 08:00 - 15:00. Südring 3B
Mo - Fr: 15:00 - 19:00. Südring 2
Sa: 11:00 - 15:00. Südring 2

Tropenmedizinische Ambulanz

Campus Virchow-Klinikum
interne Geländeadresse: Südring 2
(keine Impfung)
Mo - Fr: 08.00 - 14.00

Tollwutambulanz

Campus Virchow-Klinikum
interne Geländeadresse: Südring 2
Mo - Fr: 08.00 - 14.00

Stand 05.10.2021/CS

Ein sicherer Schutz besteht schon nach der ersten Hep. A-Impfung.

Hepatitis B

Es gibt mehrere Formen der Hepatitis. Man unterscheidet heute die sechs Erreger A bis F. Die Hepatitis B ist eine Infektionskrankheit der Leber mit dem Hepatitis B-Virus (HBV), die auch chronisch verlaufen kann.

■ Vorkommen


Der Erreger ist ein Virus, das weltweit vorkommt.

■ Übertragung

Das Virus wird meist durch Körperflüssigkeiten, insbesondere Blut und beim Geschlechtsverkehr übertragen.

■ Krankheit

Die Hepatitis B kann in ca. 10% der Fälle (bei Säuglingen 90 %) chronisch verlaufen und zum Tode führen. Langzeitreisenden und medizinischem Personal wird daher eine Impfung dringend empfohlen.



■ Impfung

Seit 1996 werden alle Säuglinge, Kinder und Jugendliche routinemäßig gegen Hepatitis B geimpft. Der in Deutschland gebräuchliche Totimpfstoff gegen Hepatitis B wird gentechnologisch hergestellt. Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfungen im Abstand von 4 Wochen und einer dritten Impfung nach 6 Monaten. In der Regel kann hierdurch ein Langzeitschutz von mindestens 10 Jahren aufgebaut werden.

Es steht auch eine kombinierte Hepatitis A+B-Impfung zur Verfügung, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn sowohl die Impfindikation für Hepatitis A als auch für Hepatitis B gegeben ist. Die Grundimmunisierung und die Schutzdauer entspricht der der Hepatitis B-Impfung.

Ein sicherer Impfschutz gegen Hepatitis B wird bei beiden Impfstoffen erst nach der dritten Impfung aufgebaut.